

Инфекции глаз

Особенности пациентов и патологии	Основные возбудители	Терапия выбора	Альтернативная терапия	Примечания
1	2	3	4	5
Блефарит				
	Этиология малоизученна, возможна роль <i>S. aureus</i> , <i>S. epidermidis</i> , розовых угрей, синдрома сухого глаза	Специфическая терапия не разработана (возможно применение Эритромицина мазь местно или Амоксицилина/клавуланата внутрь). При связи с угревой сыпью – Доксциклин вн 0,1 г 2 р/с 2 недели, затем 0,1 г 1 р/с.		При синдроме «сухого глаза» – применение искусственных слез. При абсцедировании – системная антибиотикотерапия
Дакриоцистит				
	<i>S. aureus</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>S. pyogenes</i> , <i>H. influenzae</i>	Амоксициллин/клавуланат вн 0,625 г 3 р/с или 1 г 2 р/с Цефазолин в/м 1 г 3 р/с Ко-тримоксазол вн 0,960 г 2 р/с Цефуроксим вн 0,5 г 2 р/с		В большинстве случаев в связи с обструкцией слезного протока. Обязательна консультация офтальмолога. Выбор терапии желателно основывать на результате окраски по Граму

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Кератит

Вирусный кератит

	Вирус простого герпеса 1 и 2 типа	Местно: Трифлуридин (глазные капли) Видарабин (глазные капли) Ацикловир (глазная мазь)	Ацикловир в/в 0,4 г 5 р/с 10 дн Валацикловир в/в 1 г 2 р/с 10 дн Ацикловир в/в 5 мг/кг 3 р/с 5 дн	Обязательна консультация с офтальмологом. Не применять глюкокортикоиды, в том числе местно.
	Вирус опоясывающего герпеса	Валацикловир в/в 1 г 3 р/с 10 дн	Фамцикловир в/в 0,5 г 3 р/с 10 дн Ацикловир в/в 0,8 г 5 р/с 10 дн	Системное применение показано при дравовидном герпетическом кератите с поражением стромы, герпетической язве роговицы, герпетических кератоувеитах и увеитах

Бактериальный кератит

Ношение контактных линз	P. aeruginosa	Гентамицин или Тобрамицин местно каждые 30-60 мин в течение 3 дн, затем реже	Ципрофлоксацин или Офлоксацин местно каждые 30-60 мин в течение 3 дн, затем реже	Желательно определение чувствительности возбудителя
-------------------------	---------------	--	--	---

1	2	3	4	5
Синдром «сахарного глаза», сахарный диабет, травма роговицы, иммуносу-прессия	<i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>S. pyogenes</i> , Enterobacteriaceae, <i>Listeria</i> spp.	Глазные капли: Гентамицин или Тобрамицин + Фузидовая к-та	Глазные капли: Офлоксацин Ципрофлоксацин	
Конъюнктивит				
	Аденовирус <i>H. influenzae</i> <i>S. pneumoniae</i> <i>S. pyogenes</i>	Глазные капли: Неомицин + Полмиксин В	Глазные капли: Триметоприм + Полмиксин В Сульфациетамид	
	<i>N. gonorrhoeae</i>	Цефтриаксон в/м 0,25-1 г однократно	Ципрофлоксацин вн 0,5 г 2 р/с	
	Аденовирусы	Специфической терапии не разработано		
	Вирус опоясывающего герпеса	Валацикловир вн 1 г 3 р/с	Фамцикловир вн 0,5 г 3 р/с	Курс – 10-14 дн
Острый конъюнктивит с включениями Трахома	<i>S. trachomatis</i>	Азитромицин вн 0,5 г в 1-е сут, по 0,25 г в 2-5-е сут или 1 г однократно	Доксициклин вн 0,1 г 2 р/с Эритромицин вн 0,5 г 4 р/с Левовфлоксацин вн 0,5 г 1 р/с	

1	2	3	4	5
Конъюнктивит новорожденных				
Антимикробные препараты не назначаются				
Появление в 1-й день жизни	Химический			
Появление на 2-5-й день жизни	<i>N. meningitidis</i> <i>S. aureus</i>	Цефотаксим	Ампициллин/сульбактам	Дозы см. в главе VIII
Появление на 5-10-й день жизни	<i>C. trachomatis</i>	Азитромицин	Спирамицин	
Орбитальный целлюлит (флегмона глазницы)				
Взрослые	<i>S. aureus</i> <i>S. pyogenes</i> Enterobacteriaceae	Цефепим в/м, в/в 2 г 2 р/с Цефуроксим в/м, в/в 1,5 г 3 р/с Цефотаксим в/м, в/в 2-3 г 3 р/с Цефтриаксон в/м, в/в 2 г 1 р/с	Левифлоксацин в/в, вн 0,5-1 г 1 р/с Моксифлоксацин в/в, вн 0,4 г 1 р/с Амоксициллин/клавулатат в/в 1,2 г 3 р/с или вн 0,625 г 3 р/с Оксациллин в/м, в/в 2-3 г 4 р/с + Гентамицин в/м, в/в 3-5 мг/кг 1 р/с или Амикацин в/м, в/в 15 мг/кг 1 р/с	

1	2	3	4	5
Дети	<i>H. influenzae</i>	Цефепим в/м, в/в Цефотаксим в/м, в/в Цефтриаксон в/м, в/в	Амоксицилин/клавуланат Амоксицилин/сульбактам Ко-тримоксазол + Гентамицин или Нетилмицин	Дозы для детей см. в разделе VIII
Эндодфальмит				
Включая послеоперационный	<i>S. aureus</i> <i>Pseudomonas spp.</i> Анаэробы Грибы	Интравитреально: Цефазолин + Гентамицин Парабульбарно: Цефазолин + Гентамицин Системно: Цефуроксим в/м, в/в 1,5 г 2-3 р/с или Цефазолин в/м, в/в 2 г 3 р/с + Гентамицин в/м, в/в 3-5 мг/кг 1 р/с или Ципрофлоксацин в/в, в/в 0,5 г 2 р/с	Интравитреально: Импипенем Системно: Клиндамицин в/в 0,6-0,9 г 3 р/с или Линкомицин в/м 1,2 г 2 р/с + Гентамицин в/м, в/в 3-5 мг/кг 1 р/с или Ципрофлоксацин в/в, в/в 0,5 г 2 р/с	
Наркоманы (в/в)	<i>V. cereus</i>	Интравитреально: Цефазолин + Гентамицин Системно: Клиндамицин в/в 0,6-0,9 г 3 р/с или Линкомицин в/м 1,2 г 2 р/с + Гентамицин в/м, в/в 3-5 мг/кг 1 р/с или Ципрофлоксацин в/в, в/в 0,5 г 2 р/с		