

Сепсис

Особенности пациентов и патологии	Основные возбудители	Терапия выбора	Альтернативная терапия	Примечания
1	2	3	4	5
	Неизвестный источник, внебольничный характер инфекции			
Новорожденные	Стрептококки гр.В Enterobacteriaceae S.aureus L.monocytogenes H.influenzae	Цефотаксим + Ампициллин ± Амикацин или Нетилмицин или Гентамицин	Меропенем Имипенем Ампициллин + Амикацин или Нетилмицин или Гентамицин	Дозы см. в главе VIII
Дети	H.influenzae S.pneumoniae N.meningitidis	Цефепим Цефотаксим Цефтриаксон	Амоксициллин/ клавуланат Имипенем Меропенем	Дозы см. в главе VIII
Взрослые	Грам(+) кокки Грам-) бактерии Bacteroides spp.	Цефепим в/в 2 г 2-3 р/с или Цефотаксим в/в 2-3 г 3-4 р/с или Цефтриаксон в/в 2 г 1-2 р/с + Метронидазол в/в 0,5 г 3 р/с Имипенем в/в 0,5 г 4 р/с Меропенем в/в 1 г 3 р/с Эртапенем в/в 1 г 1 р/с	Амоксициллин/клавуланат в/в 1,2 г 3 р/с Пиперациллин/тазобактам в/в 3 г 4 р/с Цефоперазон/сульбактам в/в 2 г 2-3 р/с Оксациллин в/в 3 г 4 р/с или Цефазолин 2 г 3 р/с + Амикацин в/в 15-20 мг/кг 1 р/с или Гентамицин в/в 4-5 мг/кг 1 р/с + Метронидазол в/в 0,5 г 3 р/с	

1	2	3	4	5
			Левофлоксацин в/в 0,5 г 1-2 р/с или Ципрофлоксацин в/в 0,6-0,8 г 2 р/с + Метронидазол в/в 0,5 г 3 р/с или Клиндамицин в/в 0,6-0,9 г 3 р/с	
Известный источник				
Брюшная полость	См. перитонит			
В/в катетер	См. тромбофлебит септический			
Легкие	См. пневмония, госпитализированные пациенты, тяжелое течение			
Мочевые пути	См. пиелонефрит, уросепсис			