

## Интраабдоминальные инфекции

Особенности пациентов и патологии	Основные возбудители	Терапия выбора	Альтернативная терапия	Примечания
1	2	3	4	5
<b>Перитонит</b>				
Первичный (спонтанный бактериальный перитонит)	Enterobacteriaceae S. pneumoniae S. pyogenes	Эртапенем в/в 1 г 1 р/с Амоксициллин/клавуланат в/в 1,2 г 3 р/с Моксифлоксацин в/в 0,4 г 1 р/с	Цефтриаксон в/м, в/в 1-2 г 1 р/с Цефотаксим в/м, в/в 1-2 г 3 р/с Цефепим в/м, в/в 1-2 г 2 р/с Левовфлоксацин в/в 0,5 г 1-2 р/с + Метронидазол	
Вторичный внебольничный	Enterobacteriaceae Enterococcus spp. Bacteroides spp.	Эртапенем в/в 1 г 1 р/с Пиперациллин/тазобактам в/в 3 г 4 р/с Амоксициллин/клавуланат в/в 1,2 г 3 р/с Моксифлоксацин в/в 0,4 г 1 р/с Цефтриаксон в/м, в/в 1-2 г 1 р/с или Цефотаксим в/м, в/в 1-2 г 3 р/с или Цефепим в/м, в/в 1-2 г 2 р/с + Метронидазол в/в 0,5 г 3 р/с	Цефоперазон/сульбактам в/в 2-4 г 2 р/с Имипенем в/в 0,5 г 4 р/с Меропенем в/в 1 г 3 р/с Дорипенем в/в 0,5 г 3 р/с Левовфлоксацин в/в 0,5 г 1-2 р/с или Ципрофлоксацин в/в 0,6 г 2 р/с + Метронидазол в/в 0,5 г 3 р/с	

1	2	3	4	5
нозокоміальний	<p>Enterobacteriaceae  <i>P. aeruginosa</i>  <i>S. aureus</i>  <i>Enterococcus</i> spp.  <i>Bacteroides</i> spp.  <i>Candida</i> spp.</p>	<p>Имипенем в/в 0,5 г 4 р/с  Меропенем в/в 1 г 3 р/с  Дорипенем в/в 0,5 г 3 р/с  Пиперациллин/тазобактам в/в 3 г 4 р/с  Цефоперазон/сульбактам в/в 4 г 2-3 р/с</p>	<p>Цефепим в/м, в/в 1-2 г 2 р/с или Цефтазидим в/м, в/в 1-2 г 3 р/с или Цефоперазон в/м, в/в 2-4 г 2-3 р/с или Левофлоксацин в/в 0,5 г 1-2 р/с  или Ципрофлоксацин в/в 0,6 г 2 р/с + Метронидазол в/в 0,5 г 3 р/с</p>	<p>При повторных лапаротомиях или колонизации дрожжеподобными грибами &gt; 2 локусов добавить Флуконазол или Амфотерицин В  При высокой частоте MRSA ± Линезолид или Ванкомицин</p>
Связанный с хроническим перитонеальным диализом	<p><i>S. aureus</i>  <i>S. epidermidis</i>  <i>P. aeruginosa</i>  Грамм (-) палочки</p>	<p>Линезолид в/в 0,6 г 2 р/с или Ванкомицин в/в 15 мг/кг 2 р/с + Имипенем в/в 0,5 г 4 р/с или Меропенем в/в 1 г 3 р/с или Дорипенем в/в 0,5 г 3 р/с</p>	<p>Линезолид в/в 0,6 г 2 р/с или Ванкомицин в/в 15 мг/кг 2 р/с + Цефепим в/в 1-2 г 2 р/с или Цефтазидим в/м, в/в 1-2 г 3 р/с или Пиперациллин/тазобактам в/в 3 г 4 р/с или Цефоперазон/сульбактам в/в 2-4 г 3 р/с  или Пиперациллин/тазобактам в/в 3 г 4 р/с  Амикацин в/м, в/в 15-20 мг/кг 1 р/с или Ципрофлоксацин в/в 0,6 г 2 р/с</p>	

1	2	3	4	5
Інфекції печени і жєлчєвывєдєдєщих пєтєлєй				
Холангіт, бїліарний сєпсїс	Enterobacteriaceae Enterococcus spp. Анаєробы: Bacteroides spp. Clostridium spp.	Імпїенєм в/в 0,5 г 4 р/с Мєрєпенєм в/в 1 г 3 р/с Дорїпенєм в/в 0,5 г 3 р/с Єртєпенєм в/в 1 г 1 р/с	Цєфєлєрєзон/сєлєбак-там в/в 2-4 г 2 р/с Пїперєцїлїн/тєзєбак-там в/в 3 г 4 р/с Цєфєтєксїм в/м, в/в 1-2 г 3 р/с или Цєфєлїм в/м, в/в 1-2 г 2 р/с или Лєвєфлєксєцїн в/в 0,5-1 г 1 р/с или Цїпрєфлєксєцїн в/в 0,6 г 2 р/с + Мєтрєнїдєзєл в/в 0,5 г 3 р/с	Прї пєдєзрєнїє нє аємєбєнєю єтїє-лєгїєю – вєгєдє + мєтрєнїдєзєл
Абсцєсс пєчєнї	Enterobacteriaceae Enterococcus spp. Bacteroides spp. Entamoeba histolytica	Амєкїсїдїлїн/клєвєлєнєт в/в 1,2 г 3 р/с Цєфєлєрєзон в/м, в/в 2-4 г 2-3 р/с или Цєфєтєксїм в/м, в/в 1-2 г 3 р/с или Цєфєлїм в/м, в/в 1-2 г 2 р/с или Лєвєфлєксєцїн в/в 0,5 г 1-2 р/с или Цїпрєфлєксєцїн в/в 0,6 г 2 р/с + Мєтрєнїдєзєл в/в 0,5 г 3 р/с	Пїперєцїлїн/тєзєбак-там в/в 3 г 4 р/с Цєфєлєрєзон/сєлєбак-там в/в 2-4 г 2 р/с Імпїенєм в/в 0,5 г 4 р/с Мєрєпенєм в/в 1 г 3 р/с Дорїпенєм в/в 0,5 г 3 р/с Єртєпенєм в/в 1 г 1 р/с Мєкїфлєксєцїн в/в 0,4 г 1 р/с	

1	2	3	4	5
Інфекції поджелудочної залози				
Інфіцій- риванний панкреоне- кроз, абсцес поджелудоч- ної залози	Enterobacteriaceae Enterococcus spp. Анаэробы: Bacteroides spp. Clostridium spp.	Импипенем в/в 0,5 г 4 р/с Меропенем в/в 1 г 3 р/с Дорипенем в/в 0,5 г 3 р/с	Цефоперазон/сульбак- там в/в 2-4 г 2 р/с Цефоперазон в/м, в/в 2-4 г 2-3 р/с или Цефепим в/м, в/в 1-2 г 2 р/с или Левифлоксацин в/в 0,5-1 г 1 р/с или Цифроф- локсацин в/в 0,6 г 2 р/с + Метронидазол в/в 0,5 г 3 р/с	
Абсцес селезенки				
	Streptococcus spp. S.aureus Salmonella spp. Анаэробы: Bacteroides spp.	Амоксициллин/клавуланат в/в 1,2 г 3 р/с Эртапенем в/в 1 г 1 р/с	Пиперациллин/тазобак- там в/в 3 г 4 р/с Цефепим в/м, в/в 1-2 г 2 р/с или Цефотак- сим в/м, в/в 1-2 г 3 р/с или Левифлоксацин в/в 0,5-1 г 1 р/с + Метрони- дазол в/в 0,5 г 3 р/с Моксифлоксацин в/в 0,4 г 1 р/с	