

Нейтропеническая лихорадка

| Особенности пациентов и патологии | Основные возбудители | Терапия выбора | Альтернативная терапия | Примечания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дети и взрослые | Staphylococcus spp. Enterobacteriaceae Pseudomonas spp. Зеленящие стрептококки Грибы | Имипенем в/в 0,5 г 4 р/с или Меропенем в/в 1 г 3 р/с или Дорипенем в/в 0,5 г 3 р/с или Пиперацillin/тазобактам в/в 3 г 4 р/с или Цефоперазон/сульбактам в/в 2 г 2-3 р/с ± Линезолид в/в 0,6 г 2 р/с Линезолид в/в 0,6 г 2 р/с или Ванкомицин в/в 15 мг/кг 2 р/с | Цефепим в/в 1-2 г 2-3 р/с или Цефтазидим в/в 2 г 3 р/с или Ципрофлоксацин в/в 0,6 г 2 р/с или Левофлоксацин в/в 0,5 г 2 р/с ± Линезолид в/в 0,6 г 2 р/с или Ванкомицин в/в 15 мг/кг 2 р/с или Оксациллин в/в 2-3 г 4 р/с ± Амикацин в/в 15-20 мг/кг 1 р/с | |
| При отсутствии эффекта от адекватной антибактериальной терапии в течение 5 дней или при известной инфекции/колонизации дрожжеподобными грибами – добавить противогрибковый препарат (см. раздел «Терапия грибковых инфекций») | | | | |